

Terapia i wsparcie realizowane przez rodzinę i otoczenie zapobiegają powstawaniu zaburzeń wtórnych prowadzących do:

- niepowodzeń szkolnych,
- frustracji,
- podejmowania zachowań ryzykownych,
- wykorzystania i manipulacji ze strony otoczenia itd.

Diagnoza FASD tylko dla dzieci zamieszkałych w Zielonej Górze

Dla kogo?

dzieci w wieku 3 - 10 lat z potwierdzoną prenatalną ekspozycją na alkohol

Miejsce

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Dworcowa 31/6

Zapisy

poprzez ankietę do pobrania ze strony internetowej Biura www.profilaktyka.zgora.pl więcej informacji tel. 68 411 51 79

Źródło finansowania

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra



Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

BEZPŁATNA DIAGNOZA FASD DLA DZIECI Z ZIELONEJ GÓRY



Przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u dzieci może być alkohol, który ich matki wypity w czasie ciąży, najczęściej nieświadomie.



RYZYKOWNY



CZAS



test ciążowy



czas przed ciążą



poczęcie

Przed potwierdzeniem ciąży wiele kobiet prowadzi styl życia, w którym obecny może być alkohol

FASD

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

to różnorodne problemy zdrowotne: wady, zaburzenia, deficyty oraz trudności rozwojowe powstałe na skutek prenatalnej ekspozycji płodu na alkohol.

Zespół zaburzeń FASD może wystąpić u dzieci, których matki:


- wypity alkohol w okresie zanim otrzymały informację potwierdzającą ciążę,
- spożyły alkohol w ciąży, nie mając świadomości zagrożeń dla dziecka,
- piły alkohol w ciąży, ponieważ były uzależnione.



*Okulicz-Kozaryn K., Serwis Informacyjny Uzależnienia nr 110 (2/2025)

**Okulicz-Kozaryn K., Borkowska A., Rozpowszechnienie FASD w Polsce. Projekt Alicja, PARPA, 2015 r.

Dzieci z FASD mają szansę na dobry rozwój i możliwość samodzielnego życia z sukcesami zawodowymi i rodzinnymi, ale wymagają właściwej i wczesnej diagnozy (< 6 r.ż.) będącej podstawą do zapewnienia im specjalistycznej opieki, terapii i wsparcia.



Dzieci z uszkodzeniami poalkoholowymi mogą mieć różne trudności w obszarze zdrowia, edukacji, emocji i relacji społecznych

trudności w planowaniu i organizacji
słabą uwagę wzrokową (trudności w uczeniu się z podręcznika)
brak zdolności przewidywania konsekwencji swoich działań
zaburzenia orientacji przestrzennej
zaburzenia zapamiętywania
nadwrażliwość lub niedowrażliwość słuchową
obniżoną koncentrację uwagi
zaburzenia czucia głębokiego, dotykowego, temperatury, bólu
braki w zakresie rozumienia czytanego tekstu i ludzkiej mowy
problemy z rozpoznawaniem uczuć, brak empatii
trudności w rozumieniu metafor, alegorii, intencji
wchodzenie w rolę błazna klasowego lub agresora